



ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σπινθηρογράφημα με Τεχνήτιο

1. Ο θηλασμός θα πρέπει να διακόπτεται για 24 ώρες μετά την εξέταση σε περίπτωση γαλουχίας (αν πρόκειται για σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς απαιτείται η διακοπή θηλασμού για 48 ώρες).
2. Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά για διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών.
3. Θα πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τους συγκατοίκους για το ίδιο χρονικό διάστημα.
4. Να αποφεύγεται ο ύπνος στο ίδιο κρεβάτι και οι σεξουαλικές επαφές για 48 ώρες.
5. Συνιστάται συχνή λήψη υγρών καθώς επιτυγχάνει την ταχύτερη αποβολή του Τεχνητίου από τον οργανισμό.