



## **ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ**

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ**

#### **Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με Θάλλιο**

1. Θα πρέπει να διερευνηθεί η διακοπή του θηλασμού σε περίπτωση γαλουχίας.
2. Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά για διάστημα τουλάχιστον 72 ωρών.
3. Θα πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τους συγκατοίκους για το ίδιο χρονικό διάστημα.
4. Να αποφεύγεται ο ύπνος στο ίδιο κρεβάτι και οι σεξουαλικές επαφές για 72 ώρες.
5. Συνιστάται συχνή λήψη υγρών για 3 ημέρες, καθώς επιτυγχάνει την ταχύτερη αποβολή του θαλλίου από τον οργανισμό.
6. Συνιστάται η ούρηση σε καθιστή θέση χρησιμοποιώντας 2 φορές το καζανάκι καθώς και το πλύσιμο των χεριών με άφθονο νερό μετά την χρήση της τουαλέτας.